

dans les deux sexes; le bord externe des mandibules est jaune soufre. J'en ai capturé de nombreux exemplaires au Muséum et dans la forêt de Senart.

Qu'il me soit permis, en terminant, de remercier M. le D<sup>r</sup> Tosquinet qui a bien voulu déterminer mes exemplaires.

---

SUR UNE NOUVELLE ESPÈCE DE *CÆCOSPHÆROMA*,

PAR M. A. DOLLFUS.

M. Armand Viré m'avait soumis, il y a trois ans, un très singulier Iso-pode de la famille des Sphéromiens découvert par lui dans la grotte de Baume-les-Messieurs (Jura) et que j'ai décrit dans le *Bulletin du Muséum*, 1896, p. 138, sous le nom de *Cæcosphæroma Viréi*. Depuis, M. le D<sup>r</sup> Raymond a trouvé un Sphéromien d'un genre nouveau dans un cours d'eau souterrain de l'Ardèche; la diagnose de ce *Sphæromides Raymondi* a paru récemment dans le même recueil (*Bulletin du Muséum*, 1898, p. 38). Aujourd'hui, M. Viré me communique un autre *Cæcosphæroma* de grande taille, recueilli par M. Galimard dans la grotte de la Douix, à Darcey (Côte-d'Or). Cette nouvelle découverte nous oblige à modifier légèrement l'exposé que nous avons donné des caractères génériques du genre *Cæcosphæroma*, ainsi qu'il suit :



GENRE **Cæcosphæroma**.

Corps convexe, se roulant en boule; cephalon comme dans le genre *Sphæroma*, mais dépourvu d'yeux; antennes de la première et de la deuxième paire à peu près de même longueur ♂. Pereiopodes au nombre de six ou de sept paires, le dernier segment pouvant être peu développé. Pleotelson formé par la soudure de tous les segments pleonaux avec le telson; pleopodes très minces. Uropodes appliqués et comme soudés aux côtés du pleotelson (en dessous); cette soudure peut être complète ou l'exopodite peut être encore visible, quoique tout à fait rudimentaire.

**Cæcosphæroma Burgundum** nova species.

Corps grand, convexe, muni de très petits poils punctiformes, espacés. Cephalon arrondi antérieurement; prosépistome séparé du front par une faible ligne frontale marginale; métépistome très développé; labre grand; antennes de la première paire un peu plus courtes que celles de la seconde paire, fouet de dix articles (celui de la seconde paire de douze articles). Pereion : la partie coxale du premier segment forme en dessous un large rebord; pereiopodes du premier segment plus courts que ceux des segments suivants; septième segment normal et pourvu de pereiopodes bien

développés. Pleotelson très convexe, presque bossu, ne présentant d'autre trace de segmentation qu'un petit sillon transversal incomplet; uropodes entièrement fusionnés avec le pleotelson dont ils ne forment plus en des-



*Cæcosphæroma Burgardum* Dollfus.

a. Cephalon et premier segment pereial, vus en dessous. — b. Dernier segment pereial et pleotelson, vus en dessous. — c. Deux derniers segments pereiaux et pleotelson, vus en dessus.

sous qu'un épaississement latéral; endopodites et exopodites complètement atrophiés. Couleur b'anchâtre. Dimensions : longueur, 11 millimètres; largeur, 5 millimètres.

REVISION DES TUNICIERS DU MUSÉUM (FAMILLE DES MOLGULIDÉES),

PAR M. A. PIZON,

DOCTEUR ÈS SCIENCES, PROFESSEUR AU LYCÉE JANSON-DE-SAILLY.

(LABORATOIRE DE M. LE PROFESSEUR E. PERRIER.)

Les Molgulidées appartenant aux collections du Muséum comprennent treize espèces différentes, dont huit sont nouvelles; elles se répartissent dans huit genres, dont trois sont également nouveaux.

Ces formes sont de provenances très diverses :

Deux proviennent de l'expédition du cap Horn (*Stomatropa villosa* n. sp. et *Ctenicella rugosa* n. sp.);

Une autre, très intéressante, a été rapportée en 1875 de l'île Stewart, par M. Filhol, professeur au Muséum (*Molgula Filholi* n. sp.).

M. Lebrun, préparateur à la chaire de malacologie, en a recueilli deux